

# 全国 2021 年 4 月高等教育自学考试

## 急救护理学试题

课程代码:03007

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

### 选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 急救过程的基础环节是

A. 院前急救

B. 急诊科急救

C. 危重症监护

D. 患者转运

2. 院前急救理想的急救半径是

A. 1~2km

B. 5~7km

C. 10~15km

D. 15~20km

3. 急诊分诊台宜设置于

A. 患者最集中的位置

B. 出入最方便的位置

C. 急诊科入口最明显的位置

D. 距抢救室最近的位置

4. “PQRST” 腹痛分诊法中 P 是指疼痛的

A. 性质

B. 部位

C. 诱因

D. 程度

5. 深大呼吸可见于

A. 慢性支气管炎

B. 支气管哮喘

C. 上呼吸道异物

D. 尿毒症

6. 患者,男性,34 岁,2 小时前无明显诱因出现上中腹部疼痛,后转移至右下腹,呈持续性疼痛并逐渐加重,伴恶心、呕吐。查体右下腹麦氏点压痛明显。该患者腹痛可能的病因是

A. 慢性胃炎

B. 急性胆囊炎

C. 急性阑尾炎

D. 急性胰腺炎



7. 膝关节外伤时适合的包扎方法是
- A. “8”字包扎法                      B. 环形包扎法
- C. 螺旋包扎法                        D. 回返包扎法
8. 心搏骤停后，若要使患者存活率提高到 50%，则心肺复苏开始的时间应为
- A. 小于 4 分钟                        B. 4~6 分钟
- C. 大于 6 分钟                        D. 大于 10 分钟
9. 专业人员做出心搏骤停的判断所需时间不应超过
- A. 5 秒                                B. 10 秒
- C. 20 秒                               D. 30 秒
10. 关于低渗性缺水，下列说法中正确的是
- A. 是临床最常见的水钠代谢紊乱    B. 水和钠等比例丢失
- C. 细胞内容量保持正常               D. 常伴有中枢神经系统功能障碍
11. 低钾血症患者最早出现的临床表现是
- A. 焦虑易怒                        B. 肌肉无力
- C. 麻痹性肠梗阻                    D. 直立性低血压
12. 安置休克患者体位时将其下肢抬高的目的是
- A. 减少压疮的发生                    B. 增加肺活量
- C. 预防下肢深静脉血栓               D. 增加回心血量
13. 有创呼吸机参数设置时吸气（I）与呼气（E）的时间比设置为
- A. 1:1                                B. 1:2
- C. 1:4                                D. 2:5
14. 急性肺血栓栓塞症患者溶栓治疗获得最佳效果的时间窗是症状发作的
- A. 48 小时内                        B. 72 小时内
- C. 6 天内                             D. 10 天内
15. 对大量气胸的体征描述正确的是
- A. 呼吸运动增强                    B. 气管向患侧移位
- C. 叩诊呈鼓音                       D. 呼吸音增强
16. 主动脉夹层患者的疼痛部位与夹层起源部位密切相关，若患者后背、腹部疼痛强烈，提示夹层病变累及
- A. 近端升主动脉                    B. 主动脉弓
- C. 腹主动脉                         D. 降主动脉



17. 对 Merkel 憩室并发出血有较大诊断价值的检查是
- A. 胃镜检查  
B. X 线钡餐造影  
C. 选择性动脉造影  
D. 放射性核素扫描
18. 膀胱结石的典型症状是
- A. 疼痛  
B. 发热  
C. 血尿  
D. 排尿突然中断
19. 成功治疗精索扭转的关键是
- A. 避免剧烈运动  
B. 尽早评估诊断  
C. 迅速恢复睾丸血流  
D. 解除患者思想负担
20. 对于接受药物治疗的糖尿病患者，低血糖的诊断标准为血糖水平 $\leq$
- A. 1.1mmol/L  
B. 2.2mmol/L  
C. 2.8mmol/L  
D. 3.9mmol/L
21. 确诊脑出血和蛛网膜下腔出血首选的检查是
- A. 头颅 CT  
B. MRI  
C. 脑血管造影  
D. 经颅多普勒超声检查
22. 脑出血的诱因不包括
- A. 用力排便  
B. 安静休息  
C. 饮酒  
D. 情绪激动
23. 某患者手部不慎浸入石灰水中，就诊时可见手部皮肤焦黄，失去弹性，触之如皮革，创面干燥，针刺无痛觉。该患者的烧伤深度是
- A. 一度烧伤  
B. 浅二度烧伤  
C. 深二度烧伤  
D. 三度烧伤
24. 狂犬病诊断的金标准是
- A. 血常规检查  
B. 脑脊液生化检查  
C. 直接免疫荧光法抗原检测  
D. 头颅核磁
25. 异位妊娠患者因血液刺激膈肌所引起的肩胛部放射性疼痛称为
- A. Babinski 征  
B. Danforth 征  
C. Kernig 征  
D. Thomas 征
26. 眼内异物伤患者异物取出前禁忌的措施是
- A. 局部冷敷  
B. 无菌纱布遮盖伤眼  
C. 观察有无角膜溃疡发生  
D. 剪眼睫毛
27. 食管异物最常嵌顿的位置是
- A. 食管入口处  
B. 食管上段  
C. 食管中段  
D. 食管下段



28. 重症中暑的患者一般应在 1 小时内将直肠温度降至

- A. 39℃
- B. 38℃
- C. 37℃
- D. 36℃

29. 氟马西尼是下列哪类镇静催眠药的特异性拮抗剂？

- A. 巴比妥类
- B. 苯二氮卓类
- C. 非巴比妥非苯二氮卓类
- D. 吩噻嗪类

30. CO 中毒患者典型的口唇颜色为

- A. 苍白
- B. 发绀
- C. 樱桃红
- D. 暗红

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

31. 咯血伴有胸痛常见于

- A. 肺栓塞
- B. 大叶性肺炎
- C. 肺脓肿
- D. 支气管扩张
- E. 肺结核

32. 有创机械通气中，气道压力增高的原因有

- A. 呼吸道分泌物过多
- B. 呼吸机管道打折
- C. 气管插管气囊破损
- D. 气道痉挛
- E. 压力性气胸

33. 下列检查结果中符合急性重症哮喘急性发作的是

- A. 血清 IgE 降低
- B. 支气管反应性测定呈气道高反应性
- C. 呼吸性碱中毒
- D. 有关呼吸流速的指标均显著升高
- E. 肺野透亮度增加

34. 急性胰腺炎患者有可能出现降低的指标有

- A. 血清淀粉酶
- B. 血清脂肪酶
- C. 血钾
- D. 血钙
- E. CRP

35. 喉阻塞患者四凹征的凹陷部位有

- A. 鼻翼
- B. 锁骨上窝
- C. 肋间隙
- D. 胸骨上窝
- E. 上腹部



## 非选择题部分

### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 三、简答题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。

36. 简述急诊分诊中需要紧急救治患者的生命体征标准。
37. 简述 Geneva 评分对肺血栓栓塞症患者进行初筛的主要参数。
38. 简述恶性心律失常的预防与急救护理。
39. 简述肠梗阻的急救护理原则及措施。

### 四、论述题:本大题共 1 小题,10 分。

40. 试述急性冠状动脉综合征患者胸痛的基本特征。

### 五、病例分析题:本大题共 2 小题,每小题 15 分,共 30 分。

41. 患者,男性,33 岁,因“车祸脾破裂出血半小时”平车收入抢救室。查体:

BP 74/56mmHg, HR 118 次/分, R 27 次/分, T 36.1℃, 神志清楚,表情淡漠,面色苍白,四肢皮肤湿冷、发花。

请结合病例回答:

- (1) 该患者目前最主要的并发症及其判断依据;
- (2) 应采取的急救措施。

42. 患者,女性,69 岁,糖尿病病史 20 余年,采用胰岛素治疗。1 周前受凉后咳嗽、咳痰伴发热,自服感冒药效果不佳,2 天前出现恶心呕吐、食欲不佳,2 小时前家人发现其神志模糊,急送急诊。体格检查:P 110 次/分,R 26 次/分,BP 120/70mmHg,身高 156cm,体重 65kg,神志不清,呼之不应,皮肤弹性差,呼气有烂苹果味,双肺呼吸音粗,双肺底有湿啰音,心率 110 次/分,律齐,无杂音。实验室检查:血糖 23.12mmol/L,尿糖(++++) ,尿酮(++++)。

请结合病例回答:

- (1) 该患者神志不清最可能的原因;
- (2) 病情监测指标;
- (3) 目前应采取的治疗原则。

