

2023 年 4 月高等教育自学考试 急救护理学试题

课程代码:03007

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 急救过程的基础环节是

- | | |
|------------|----------|
| A. 通讯指挥系统 | B. 院前急救 |
| C. 医院急诊科急救 | D. 危重症监护 |

2. 对于疑似诸如病毒感染者应采用的隔离技术是

- | | |
|---------------|-------------|
| A. 飞沫传播疾病隔离 | B. 空气传播疾病隔离 |
| C. 血液体液传播疾病隔离 | D. 接触传播疾病隔离 |

3. 急诊分诊护士定期接受急救技能再培训的时间间隔原则上不超过

- | | |
|--------|--------|
| A. 1 年 | B. 2 年 |
| C. 3 年 | D. 4 年 |

4. 患儿,女性,7 岁,进食过程中突发呼吸困难,吸气时出现“三凹征”伴有高调吸气性哮鸣音,其原因最可能的是

- | | |
|-------------|-----------|
| A. 慢性阻塞性肺疾病 | B. 支气管哮喘 |
| C. 大量胸水 | D. 上呼吸道异物 |

5. 低渗性缺水的患者不可能出现的症状为

- | | |
|----------|----------|
| A. 口渴 | B. 疲乏 |
| C. 尿比重降低 | D. 腱反射减弱 |



6. 院外心搏骤停急救生存链的首个环节是
- A. 快速除颤
 - B. 监测和预防
 - C. 识别和启动应急反应系统
 - D. 及时高质量心肺复苏
7. 休克治疗中补充血容量应遵循
- A. 先晶体液后胶体液，先快后慢
 - B. 先胶体液后晶体液，先快后慢
 - C. 先晶体液后胶体液，先慢后快
 - D. 先胶体液后晶体液，先慢后快
8. 为颈椎损伤患者开放气道应采用
- A. 仰头提颏法
 - B. 反转法
 - C. 推举下颌法
 - D. 背负法
9. 机械通气时吸气与呼气的时间比一般设置为
- A. 1 : 1
 - B. 1 : 2
 - C. 1 : 3
 - D. 1 : 4
10. 患者，男性，35岁，因自发性气胸行胸腔闭式引流术，术后活动时不慎将引流管扯脱，此时护士首先应该
- A. 让患者立即平卧
 - B. 将脱落的引流管重新插回胸腔
 - C. 用无菌敷料封闭伤口
 - D. 用粗针头行胸膜穿刺抽气
11. 主动脉夹层患者的胸痛常表现为
- A. 间断绞窄性剧烈疼痛
 - B. 突发触电样轻微灼痛
 - C. 阵发性压榨样隐痛
 - D. 突发撕裂样剧烈疼痛
12. 上消化道出血的特征性表现是
- A. 腹痛和腹胀
 - B. 恶心和呕吐
 - C. 呕血和黑便
 - D. 腹部压痛和反跳痛
13. 急性胰腺炎在我国最常见的病因是
- A. 胰管梗阻
 - B. 暴饮暴食
 - C. 酗酒
 - D. 胆道疾病
14. 急性胰腺炎患者为减轻腹痛首选的体位是
- A. 平卧位
 - B. 屈膝侧卧位
 - C. 俯卧位
 - D. 仰卧中凹位
15. 尿路尿酸结石患者应避免进食
- A. 动物内脏
 - B. 浓茶咖啡
 - C. 高糖水果
 - D. 豆制品



16. 影响低血糖症状发生和严重程度的因素不包括
- A. 血糖下降程度
 - B. 血糖下降速度
 - C. 机体反应性
 - D. 患者意识状态
17. 下列关于短暂性脑缺血发作的临床特点的描述, 正确的是
- A. 房颤患者高发
 - B. 临床症状多持续 10-15min
 - C. 多遗留神经功能缺损
 - D. 影像学检查可见责任病灶
18. 确诊脑出血首选的检查是
- A. 头颅 CT
 - B. 脑血管造影
 - C. 经颅多普勒超声
 - D. 头颅 MRI
19. 脑栓塞最常见的栓子来源是
- A. 癌栓
 - B. 菌栓
 - C. 脂肪栓
 - D. 房颤附壁血栓
20. 患者, 女性, 30 岁, 主因“车祸致颅脑损伤半小时”来诊, 急诊行颅内血肿清除术。术后 8h 护士发现患者的引流液颜色变深, 呈鲜红色, 引流量较前增加。患者最可能出现的问题是
- A. 脑室感染
 - B. 脑脊液漏
 - C. 颅内活动性出血
 - D. 脑水肿
21. 下列指标中, 提示成人烧伤患者液体复苏有效的是
- A. 尿量 17ml/h
 - B. 脉率 92 次/分
 - C. 收缩压 86mmHg
 - D. 中心静脉压 3cmH₂O
22. 患者, 男性, 26 岁, 因左上肢烧伤急诊就医。烧伤处局部肿胀, 表皮棕黄色, 间或有较大水泡, 感觉迟钝, 拔毛痛, 温度较低。该患者的烧伤深度为
- A. 一度烧伤
 - B. 浅二度烧伤
 - C. 深二度烧伤
 - D. 三度烧伤
23. 急产对母体的影响一般不包括
- A. 子宫破裂
 - B. 腹腔内大出血
 - C. 软产道撕裂
 - D. 子宫肌纤维缩复不良
24. 急产儿肌注维生素 K₁ 是为了预防
- A. 维生素缺乏
 - B. 佝偻病
 - C. 新生儿感染
 - D. 颅内出血



25. 患者，女性，53岁，主因“右眼胀痛，恶心呕吐，视物模糊3小时”来诊，诊断为急性闭角型青光眼。患者既往有哮喘病史，因此降眼压时禁用
- A. β -肾上腺素受体阻滞剂 B. 缩瞳剂
C. 碳酸酐酶抑制剂 D. 高渗剂
26. 下列关于鼻骨骨折的急救护理措施中，正确的是
- A. 持续冰敷72小时 B. 用力按压鼻背部止血
C. 擤鼻以尽快排出鼻腔血液 D. 肿胀消退后复位
27. 下列因素中不易引起中暑的是
- A. 甲状腺功能减低 B. 高湿度
C. 高热辐射 D. 过度肥胖
28. 下列临床表现提示为轻度冻僵的是
- A. 寒战 B. 昏迷
C. 关节僵硬 D. 心搏停止
29. 关于有机磷农药中毒患者的急救护理措施，描述正确的是
- A. 尽快用热水冲洗染毒皮肤
B. 首次洗胃需彻底
C. 中毒超过6小时者禁止洗胃
D. 鼓励患者洗胃后尽早进食
30. 有机磷农药中毒患者的临床表现中，属于烟碱样症状的是
- A. 瞳孔缩小 B. 视物模糊
C. 四肢肌束颤动 D. 腺体分泌亢进

二、多项选择题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

31. 慢性心衰患者出现下列表现，提示可能出现了洋地黄中毒的有
- A. 室性期前收缩 B. 视觉异常
C. 呼吸困难 D. 尿比重降低
E. 恶心、呕吐
32. 急性胰腺炎减少胰酶分泌的治疗措施包括
- A. 禁食 B. 胃肠减压
C. 哌替啶治疗 D. 生长抑素治疗
E. 奥美拉唑治疗
33. 甲状腺危象患者血液甲状腺功能指标中，明显增高的包括
- A. 总 T_3 B. 游离 T_3
C. 总 T_4 D. 游离 T_4
E. TSH



34. 符合癫痫患者强直阵挛发作表现的有
- A. 意识丧失
 - B. 跌倒
 - C. 全身骨骼肌持续收缩
 - D. 呼吸停止
 - E. 唾液及其他分泌物减少
35. 热射病“三联征”的典型表现有
- A. 肌痉挛
 - B. 意识障碍
 - C. 高热
 - D. 恶心呕吐
 - E. 无汗

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、简答题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

36. 简述急危重症患者转运前安全性评估的基本内容。
37. 简述昏迷患者病情危重的指征。
38. 简述全身炎症反应综合征(SIRS)的判断指标。
39. 简述急性会厌炎急救时行气管切开的指征。

四、论述题: 本大题共 1 小题, 10 分。

40. 试述糖尿病酮症酸中毒常见并发症的预防与处理。

五、病例分析题: 本大题共 2 小题, 每小题 15 分, 共 30 分。

41. 患者, 女性, 65 岁, 因疲乏、心前区疼痛不适 1 周, 由女儿陪同就急诊。既往有“三度房室传导阻滞”病史。

请写出:

- (1) 急诊护士分诊评估的内容;
- (2) 四级病情分级标准及该患者的病情分类。

42. 患者, 男性, 56 岁, 高血压病史 15 年, 未规律诊治, 血压维持在 160/100mmHg。2 小时前与家人争吵后突然出现头痛、言语不利、继而倒地、呼之不应、二便失禁, 由家人送至急诊。查体: T 36.6℃, P 88 次/分, R 20 次/分, 血压 180/110mmHg, 昏迷, 双侧瞳孔等大, 颈软, 巴宾斯基征阳性。急查头颅 CT 示右侧基底节区高密度影, 边界清楚。医嘱给予静脉滴注甘露醇脱水、硝普钠降压治疗。

请写出:

- (1) 该患者最可能的卒中类型及判断依据;
- (2) 目前该患者的急救护理要点。

