

2025 年 4 月高等教育自学考试

急救护理学试题

课程代码:03007

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 急救护理始于

A. 南丁格尔时代

B. 十八世纪六十年代

C. 希波克拉底时代

D. 二十世纪六十年代

2. 急诊患者的心理特点一般不包括

A. 恐惧感

B. 抗拒感

C. 优先感

D. 陌生感

3. “SOAP” 急诊分诊法中, P 是指

A. 收集患者的主诉

B. 观察患者的现有症状

C. 评估患者的生命体征

D. 计划安排患者的就诊位置及顺序

4. 腹内某脏器遭受刺激后却在体表产生远离病变脏器部位的疼痛, 称为

A. 真性腹痛

B. 假性腹痛

C. 牵涉痛

D. 类似内脏痛

5. 院内心搏骤停生存链的第一环是

A. 心搏骤停的监测和预防

B. 即时高质量心肺复苏

C. 快速除颤

D. 高级生命维持



6. 使用仰头抬颏法开放气道时，下颌角与耳垂的连线与地面形成的夹角应为
- A. 45° B. 75°
C. 90° D. 120°
7. 为心搏骤停患者实施高级心血管生命支持时，气道管理的“金标准”是
- A. 口咽通气道 B. 喉罩
C. 环甲膜穿刺 D. 气管插管
8. 血清钙浓度的正常值为
- A. $2.25\sim 2.75\text{mmol/L}$ B. $3.5\sim 5.5\text{mmol/L}$
C. $22\sim 27\text{mmol/L}$ D. $130\sim 150\text{mmol/L}$
9. 高钠血症患者的补液量计算时一般不应包含
- A. 生理需要量 B. 已经损失量
C. 继续损失量 D. 预估损失量
10. 动脉血气分析各指标中，反映代谢性因素的是
- A. 血液酸碱度 B. 标准碳酸氢盐
C. 血氧饱和度 D. 动脉血二氧化碳分压
11. 为卧位患者除颤时，关于操作者 APEX 手柄使用及位置的说法正确的是
- A. 左手持手柄电极，置于患者右腋中线第 2 肋间
B. 左手持手柄电极，置于患者左腋中线第 2 肋间
C. 右手持手柄电极，置于患者右腋中线第 5 肋间
D. 右手持手柄电极，置于患者左腋中线第 5 肋间
12. 患者，男性，19 岁，瘦高体型，既往体健。今日在宿舍抬举重物后突然胸痛、呼吸困难，伴刺激性咳嗽，急诊就诊。该患者最可能出现了
- A. 哮喘急性发作 B. 自发性气胸
C. 急性肺炎 D. 肺栓塞
13. 鉴别不稳定型心绞痛和非 ST 段抬高型心肌梗死的主要标准是
- A. 心电图 B. 超声心动图
C. 血清心肌损伤标志物 D. 脑钠肽
14. 急性肺水肿患者镇静时，首选的药物是
- A. 毛花苷 C B. 呋塞米
C. 硝普钠 D. 吗啡



15. 主动脉夹层患者后背及腹部疼痛强烈，提示夹层形成部位为
 - A. 近端升主动脉
 - B. 主动脉弓
 - C. 降主动脉
 - D. 腹主动脉
16. 麻痹性肠梗阻的临床特点是
 - A. 阵发性剧烈绞痛
 - B. 持续性刀割样腹痛
 - C. 持续性腹部胀痛不适
 - D. 进行性加剧的腹绞痛
17. 有助于增加尿中草酸溶解度的药物是
 - A. 氧化镁
 - B. 山莨菪碱
 - C. 碳酸氢钠
 - D. 维生素 B₆
18. 饮水预防尿路结石，效果较好的饮水时间是
 - A. 睡前
 - B. 清晨
 - C. 餐前
 - D. 餐后
19. 活动后镜下血尿常见于
 - A. 膀胱结石
 - B. 尿道结石
 - C. 肾结石
 - D. 尿路完全梗阻
20. 精索扭转救治成功的关键是
 - A. 迅速恢复睾丸血流
 - B. 早期发现明确诊断
 - C. 早期手术探查
 - D. 合理镇痛
21. 糖尿病酮症酸中毒患者治疗中最常见的电解质紊乱是
 - A. 高钾血症
 - B. 低钾血症
 - C. 高钙血症
 - D. 低钙血症
22. 对于糖尿病患者，低血糖的诊断标准是血糖水平不高于
 - A. 6.1mmol/L
 - B. 3.9mmol/L
 - C. 2.8mmol/L
 - D. 2.1mmol/L
23. 目前治疗缺血性脑卒中最重要恢复血流措施是
 - A. 介入治疗
 - B. 脱水治疗
 - C. 溶栓治疗
 - D. 降压治疗
24. 狂犬病患者最特殊的临床表现是
 - A. 恐水
 - B. 畏光
 - C. 失眠
 - D. 易怒

25. 新生儿复苏暖台的温度应为
- A. 20~26℃ B. 28~34℃
C. 36~40℃ D. 42~46℃
26. 患者，女性，54岁，主因右眼胀痛，恶心呕吐，视物模糊4小时来诊，诊断为急性闭角型青光眼。医生开具了20%甘露醇250ml静脉滴注，护士向患者解释使用该药的目的是
- A. 降低颅内压 B. 降低眼压
C. 利尿 D. 减轻水肿
27. 急性闭角型青光眼患者停止使用 β -肾上腺素受体阻滞剂的指征是
- A. 脉率<120次/分 B. 脉率<100次/分
C. 脉率<80次/分 D. 脉率<60次/分
28. 患儿，男性，3岁，主因发热、咳嗽2日，呼吸困难伴喉鸣3小时来诊。患儿极度呼吸困难，声音嘶哑，阵发性犬吠样咳嗽。查体：鼻翼扇动，口唇发绀，咽喉红肿，吸气性喉鸣伴三凹征。该患儿最可能出现的问题是
- A. 喉部异物 B. 急性喉炎
C. 急性支气管炎 D. 大叶性肺炎
29. 某环卫工人于夏季室外作业时出现头晕、恶心、呕吐，休息后不缓解，遂至急诊。查体：神志清楚，大汗淋漓、面色苍白、皮肤湿冷，脉搏细数，呼吸22次/分，血压90/60mmHg。判断该患者的中暑类型为
- A. 轻症中暑 B. 热痉挛
C. 热衰竭 D. 热射病
30. 下列症状提示阿托品中毒的是
- A. 颜面潮红 B. 瞳孔扩大
C. 心率102次/分 D. 体温40.3℃

二、多项选择题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

31. 腹膜刺激征表现为
- A. 腹部压痛 B. 腹部反跳痛
C. 腹壁肌卫 D. 移动性浊音阳性
E. 排便排气停止



32. 下列提示心肺复苏有效的指标包括

- A. 肌张力丧失
- B. 有眼球活动
- C. 自主呼吸恢复
- D. 意识部分恢复
- E. 上肢收缩压达 45mmHg

33. 休克患者的输血指征包括

- A. 血红蛋白<70g/L
- B. 收缩压<90mmHg
- C. 中心静脉压 12cmH₂O
- D. 红细胞压积<0.25
- E. 尿量>30ml/h

34. 大量气胸患者可出现的体征包括

- A. 呼吸运动减弱
- B. 胸部膨隆
- C. 气管向患侧移位
- D. 语颤减弱
- E. 肋间隙变窄

35. 小脑出血的典型临床表现包括

- A. 头痛
- B. 眩晕
- C. 呕吐
- D. 构音障碍
- E. 肢体瘫痪

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

36. 简述致命性呼吸困难的指征。

37. 简述安置临时起搏器患者的护理。

38. 简述急性上消化道出血患者出血量的评估方法。

39. 简述甲状腺危象患者病史评估的内容。


四、论述题：本大题共 1 小题，10 分。

40. 试述癫痫发作时的急救护理措施。



五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

41. 患者，男性，58 岁，因突发胸痛 2 小时呼叫 120。转运途中患者突然全身抽搐、意识丧失，心电图显示：



请写出：

- (1) 该患者意识丧失可能的原因及心律失常类型；
- (2) 现场人员应立即采取的急救措施。

42. 患者，男性，34 岁，因大面积烧伤急诊就医。患者全身烧伤总面积为 48%，其中 18% 为三度烧伤，30%为二度烧伤。查体：T 35.9℃，BP 82/50mmHg，R 34 次/分，HR 132 次/分。

请写出：

- (1) 根据新九分法，该患者的烧伤病情程度；
- (2) 使用暴露疗法时该患者的创面护理措施。

