

2026 年 4 月高等教育自学考试

急救护理学试题

课程代码:03007

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 急诊患者经过初步评估后应立即给予
 - A. 诊断
 - B. 稳定生命体征
 - C. 治疗
 - D. 安置留院观察
2. 急诊患者入院后再评估的时间间隔为
 - A. 每隔 5min
 - B. 每隔 15min
 - C. 每隔 30min
 - D. 每隔 60min
3. 深大呼吸,也称为 Kussmaul 呼吸,可见于
 - A. 重症肺炎
 - B. 严重哮喘
 - C. 尿毒症
 - D. 慢性阻塞性肺疾病
4. 患者,男性,63 岁,高血压病史 20 年。1 小时前无明确诱因突发心前区撕裂样疼痛,程度剧烈,呈持续性,范围逐渐向腹部扩散,休息后疼痛不缓解。左上肢血压 180/100mmHg,右上肢血压 130/80mmHg,心肌损伤标志物正常。该患者胸痛的原因最可能为
 - A. 自发性气胸
 - B. 肺梗死
 - C. 急性冠状动脉综合征
 - D. 主动脉夹层



5. 导致咯血的最常见的肺部疾病是
- A. 肺炎
B. 肺结核
C. 肺脓肿
D. 肺淤血
6. 院内心搏骤停急救生存链的第一环是
- A. 识别和启动应急反应系统
B. 监测和预防
C. 即时高质量心肺复苏
D. 快速除颤
7. 根据基础生命支持的流程，实施心肺复苏现场急救的第一步是
- A. 环境评估
B. 反应评估
C. 启动 EMS 或 ERS
D. 取 AED
8. 成人的血钙正常值为
- A. 130~150mmol/L
B. 22~27mmol/L
C. 3.5~5.5mmol/L
D. 2.25~2.75mmol/L
9. 自体固定法适用于
- A. 下肢骨折
B. 脊椎骨折
C. 锁骨骨折
D. 肱骨骨折
10. 下列动脉血气分析结果可判断为 II 型呼吸衰竭的是
- A. PaO_2 64mmHg, PaCO_2 37mmHg
B. PaO_2 64mmHg, PaCO_2 64mmHg
C. PaO_2 37mmHg, PaCO_2 64mmHg
D. PaO_2 37mmHg, PaCO_2 37mmHg
11. 急性冠状动脉综合征患者应尽早接受阿司匹林治疗，其起始负荷量为
- A. 75mg
B. 100mg
C. 200mg
D. 300mg
12. 下列对于临时起搏器的描述，正确的是
- A. 放置时间一般不超过 2 天
B. 适用于症状性心动过速患者
C. 电极置于左室心尖部
D. 无固定装置，易发生电极移位
13. 患者，男性，32 岁，因酒后突发腹痛就诊，初步诊断为急性胰腺炎，医嘱给予施他宁（生长抑素）持续静脉滴入治疗。急诊护士对该药作用机制的解释正确的是
- A. 抑制 DNA 合成
B. 抑制胰酶分泌
C. 扩张 Oddi 括约肌
D. 抑制胰蛋白酶活性
14. 急性胰腺炎患者禁食的目的不包括
- A. 降低机体代谢率
B. 缓解腹痛
C. 减少胰液分泌
D. 减轻腹胀
15. 尿路结石患者减轻疼痛宜采取的体位是
- A. 平卧位
B. 屈膝侧卧位
C. 俯卧位
D. 头低脚高位



16. 尿道结石的典型症状是
- A. 疼痛和血尿
B. 恶心、呕吐
C. 排尿突然中断
D. 排尿困难
17. 有助于减少尿中草酸含量的药物是
- A. 碳酸氢钠
B. 山莨菪碱
C. 氧化镁
D. 维生素 B₆
18. 为保全精索扭转患者睾丸功能基本不受影响，发生精索扭转后，复位应在
- A. 6 小时内
B. 12 小时内
C. 18 小时内
D. 24 小时内
19. 对于意识清楚的低血糖患者采取升血糖治疗，可立即给予患者口服
- A. 1g 升糖激素
B. 5~10g 葡萄糖粉
C. 15~20g 水果糖块
D. 50g 无糖饼干
20. 甲状腺危象患者常规治疗无反应时可选用的治疗为
- A. 甲状腺次全切除术
B. 免疫治疗
C. 血浆置换
D. 冬眠治疗
21. 甲状腺危象的典型表现不包括
- A. 高热
B. 心动过速
C. 极度烦躁不安
D. 黄视绿视
22. 脑血栓形成最常见的病因是
- A. 脑动脉炎
B. 先天性脑动脉狭窄
C. 血管瘤
D. 脑动脉粥样硬化
23. 缺血性脑卒中的患者，通过静脉溶栓有效抢救半暗带组织的时间窗为
- A. 6 小时内
B. 12 小时内
C. 24 小时内
D. 1 周内
24. 胸部损伤合并张力性气胸时，患侧叩诊音为
- A. 鼓音
B. 清音
C. 过清音
D. 浊音
25. 下列指标中，提示甲氨蝶呤治疗异位妊娠有效的是
- A. 脱发
B. 血白细胞下降
C. 连续 3 次血 HCG 阴性
D. 肝功能异常
26. 患者，男性，28 岁，主因“眼内铁质异物 2 小时”来诊。对该患者的急救护理措施错误的是
- A. 密切监测眼压变化
B. 观察有无角膜溃疡等并发症
C. 异物取出术前冲洗结膜囊
D. 异物取出术后遵医嘱使用抗生素





35. 急性闭角型青光眼患者临床前期的表现有
- A. 前房浅
 - B. 虹膜膨隆
 - C. 房角增宽
 - D. 暗室激发试验阳性
 - E. 傍晚突感雾视

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、简答题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

36. 简述急诊患者的五级病情分级标准。
37. 简述晕厥患者分诊评估中对病史评估的主要内容。
38. 简述恶性心律失常的预防与急救护理。
39. 简述糖尿病酮症酸中毒的治疗原则。

四、论述题: 本大题共 1 小题, 10 分。

40. 试述成人重度烧伤患者的输液原则及液体复苏有效的指标。

五、病例分析题: 本大题共 2 小题, 每小题 15 分, 共 30 分。

41. 患者, 男性, 62 岁, 主因“反复发作胸闷、气喘 18 年, 加重 2 天”入院。患者神清、急性病容、呼吸急促、全身大汗、端坐位。查体: T 36.7℃, BP 152/88mmHg, R 34 次/分, HR 122 次/分, SaO₂ 89%, 肺部听诊呼气相延长, 可闻及响亮而弥漫的哮鸣音。动脉血气分析示: PaO₂ 58mmHg, PaCO₂ 46mmHg。医嘱给予氧疗、抗炎、补液、祛痰及舒张支气管等治疗。

请写出:

- (1) 该患者目前最可能的诊断以及病情严重程度分级;
- (2) 该患者氧疗及促进排痰的急救护理措施。

42. 患者, 男性, 46 岁, 消化性溃疡病史 5 年, 因“反复上腹隐痛 10 年, 呕血、黑便 4 小时”急诊入院。最近工作压力大, 生活不规律。4 小时前患者起床后突然呕血 1 次, 量约 200ml, 黑便 2 次, 量不详, 伴头晕。查体: T 36.5℃, P 108 次/分, R 20 次/分, BP 90/50mmHg, 神清合作, 面色苍白, 双肺呼吸音清晰, 心率 108 次/分, 腹软, 剑突下压痛, 无反跳痛, 肝、脾未及, 肠鸣音 18 次/分, 移动性浊音阴性。

请写出:

- (1) 该患者消化道出血可能的病因;
- (2) 为进一步明确诊断首选的检查方法;
- (3) 应立即采取的急救护理措施。

