

全国 2019 年 10 月高等教育自学考试
护理学研究试题
课程代码:03008

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题: 本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 国外护理研究的发展起源于 20 世纪 20 年代初期,当时着重于
 - A. 护理教育的研究
 - B. 医院环境的研究
 - C. 护理工作程序的研究
 - D. 护士角色的研究
2. 如果某研究者仅通过查阅医院病案室的病例来进行资料分析和研究,此时的研究风险级别是
 - A. 永久性伤害的可能
 - B. 较严重的暂时不适
 - C. 暂时的不适
 - D. 无可预见的影响
3. 在研究中研究对象有权决定是否参加研究,这体现了研究对象的
 - A. 隐私权
 - B. 公平治疗的权利
 - C. 自主决定权
 - D. 免于遭受伤害的权利
4. 下列题目中选题范围过大的是
 - A. 对进行体温测试的时间选择的研究
 - B. 探讨急诊科患者的心理护理
 - C. 对密闭式吸痰管更换时间的研究
 - D. 加味金钱草汤对肾结石患者排石效果的临床研究



5. 按照文献的级别, 教科书属于
 - A. 一次文献
 - B. 二次文献
 - C. 三次文献
 - D. 零次文献
6. 某护士研究“对同样的患者进行同样内容的健康宣教, 应用不同的宣教方法将会产生怎样的健康教育效果”时, 其中的自变量是
 - A. 患者知识的变化
 - B. 各类不同的教学方法
 - C. 患者能力的变化
 - D. 研究者宣教时的环境
7. 撰写论文题目时字数一般不超过
 - A. 15 个汉字
 - B. 20 个汉字
 - C. 25 个汉字
 - D. 30 个汉字
8. 某研究者想要查找艾滋病方面的相关文献, 已知艾滋病方面的研究是从 1981 年开始的, 该研究者从 1981 年以后逐年向近期查找文献。这种文献检索方法是
 - A. 顺查法
 - B. 倒查法
 - C. 抽查法
 - D. 追溯法
9. 为了排除与研究无关的干扰因素的影响, 突出试验中干预措施的效应, 在研究设计中需要
 - A. 干预
 - B. 随机化
 - C. 盲法
 - D. 设立对照
10. 在类实验性研究设计中一定要有
 - A. 随机化
 - B. 干预
 - C. 设立对照
 - D. 盲法
11. 有关癌症晚期患者照顾者的照顾体验的研究属于
 - A. 现象学研究
 - B. 根基理论研究
 - C. 人种学研究
 - D. 纵向研究
12. 研究者没有采取随机抽样的方法, 而是先将总体按某种或某些特征分成不同的类别, 然后依照每一类中个体数占总体的比例来抽取相应数目的个体构成样本, 这种抽样方法是
 - A. 方便抽样
 - B. 定额抽样
 - C. 目的抽样
 - D. 滚雪球抽样
13. 用一条 100mm 长的直线表示程度的差异, 普遍用于人们对某种经历的感受, 目前又设计出脸谱、阶梯等用形象图形表示的形式, 这种类型的量表为
 - A. 评定量表
 - B. Likert 量表
 - C. 语义差异量表
 - D. 视觉类似物量表

14. 某研究者在参与护理工作中观察护士的活动，是以观察为主，参与为辅。此时观察者与被观察者的关系是

A. 局外观察者 B. 参与性观察者
C. 观察性参与者 D. 完全参与者
15. 一般认为研究工具的信度较为理想时需要相关系数高于

A. 0.5 B. 0.6
C. 0.7 D. 1.0
16. 可以减少抽样误差的方法是

A. 采用方便抽样 B. 选择变异程度小的研究指标
C. 采用目的抽样 D. 选择非实验性研究设计
17. 某研究者采用焦虑自评量表，测量了 210 名肾移植术后患者的焦虑状况，患者量表得分为正态分布。若要将患者的量表得分与该量表的常模（正常人）比较，可采用的统计学方法是

A. 独立样本 t 检验 B. 配对 t 检验
C. 秩和检验 D. 方差分析
18. 某护士欲用统计图的形式来表示 6 岁以内儿童身高随年龄的增长情况，应选择的统计图种类是

A. 圆图 B. 单式直条图
C. 复式直条图 D. 线图
19. 将书刊资料所刊载的文章的题目、作者、出处以及所论及的主题等进行著录，并按照一定的原则和方法编排而成的检索工具是

A. 目录 B. 题录
C. 索引 D. 文摘
20. 下列对护理个案论文的描述，正确的是

A. 针对个案护理的资料进行研究 B. 是量化研究的一种
C. 研究成果可以大规模推广 D. 不用必须按照护理程序的思路进行撰写

22. 下列有关伦理审查委员会（IRB）的描述，正确的是
- A. 每个 IRB 都包括至少 5 名成员
 - B. 可在大学、医院以及医疗保健中心设立
 - C. IRB 中至少 2 人为非研究机构成员
 - D. IRB 的成员必须具备相似的教育背景
 - E. 护士可以成为 IRB 的成员
23. 下列属于无序分类变量的是
- A. 性别（男、女）
 - B. 疗效（治愈、显效、好转、无效）
 - C. 血型（O 型、A 型、B 型、AB 型）
 - D. 药物反应（阴性、阳性）
 - E. 贫血（重度、中度、轻度）
24. 下列有关预试验的描述，正确的是
- A. 在正式开始研究工作的第一阶段进行
 - B. 可以检查研究设计是否切合实际
 - C. 可以获得研究工具的信度和效度方面的资料
 - D. 有助于核实样本量的估计是否合适
 - E. 使参加研究课题的研究人员可以统一方法，减少误差
25. 理想的概念框架图应具备的特征是
- A. 美观性
 - B. 逻辑性
 - C. 开放性
 - D. 指导性
 - E. 创新性
26. 实验性研究的优点有
- A. 是检验因果假设最有说服力的一种研究设计
 - B. 最大限度地控制了外变量对于依变量的影响
 - C. 不容易触犯伦理问题
 - D. 反映研究的科学性和客观性较高
 - E. 在护理研究领域的应用具有普遍性
27. 信息性偏倚包括
- A. 回忆偏倚
 - B. 报告偏倚
 - C. 诊断怀疑偏倚
 - D. 测量偏倚
 - E. 选择性偏倚



28. 在设计收集资料的方案前应考虑的问题有
- A. 采用随机还是非随机抽样
 - B. 采用结构式还是非结构式方法
 - C. 采用定量还是定性方法
 - D. 资料是否要求严格的客观性
 - E. 是否存在霍桑效应的影响
29. 自设问卷时问卷的用词要求有
- A. 清晰
 - B. 适合被问者的文化程度
 - C. 不要暗示答案
 - D. 多使用专业术语
 - E. 敏感问题应采用第二人称进行询问
30. 某研究者计划测量《护理工作满意度问卷》的内在一致性, 下面可以用来反映此研究工具内在一致性的方法是
- A. 折半信度
 - B. 重测相关系数
 - C. KR-20 值
 - D. Cronbach' α 系数
 - E. 因子载荷系数
31. 关于效标关联效度的陈述, 正确的是
- A. 反映研究工具与其他测量标准之间的关系
 - B. 体现研究工具与其所测量概念的相符程度
 - C. 可以判断研究工具是否包括足够的项目
 - D. 可以判断研究工具所包含内容的分配比例
 - E. 分为同时效度和预测效度
32. 某研究者欲比较某市两家医院护理人员学历构成(中专、大专、本科)情况有无差别, 可以考虑使用的统计学分析方法有
- A. Mann-Whitney U 检验
 - B. Wilcoxon 秩和检验
 - C. Pearson 相关分析
 - D. t 检验
 - E. χ^2 检验
33. 护理综述论文的特征是
- A. 信息性
 - B. 新颖性
 - C. 综合性
 - D. 描述性
 - E. 客观性



非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题: 本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分。

- 34. 假设
- 35. 比较性研究
- 36. 回译
- 37. 重测信度
- 38. 计数资料
- 39. 研究指标

四、简答题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

- 40. 简述医学文献的阅读策略。
- 41. 简述整群抽样的优点。
- 42. 简述统计图中纵轴和横轴的绘制要求。
- 43. 简述护理研究论文结果部分撰写的注意事项。

五、应用题: 本大题共 1 小题, 10 分。

- 44. 某研究者调查了两所医院护士操作考试情况, 总结为如下统计表。请指出在统计表的结构与绘制方面存在的问题, 并说明如何改正。

表 5-1 两所医院护士情况

组别	总例数	合格		不合格	
		例数(n)	合格率(%)	例数(n)	合格率(%)
医院 A	48	42	87.5	6	12.5
医院 B	46	38	82.5	8	17.39
合计	94	80	85.1	14	14.89

