

2024 年 10 月高等教育自学考试
外科护理学(专)试题
课程代码:13195

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。


一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 属于伤口感染的外源性因素的是
 - A. 病人免疫力低
 - B. 手术止血不彻底
 - C. 伤口存在血肿
 - D. 手术器械污染
2. 预防性引流拔除时限为
 - A. 8 小时内
 - B. 12 小时内
 - C. 24~48 小时内
 - D. 72 小时内
3. 手术后切口疼痛最强烈的时间是
 - A. 麻醉消失时
 - B. 术后 24 小时内
 - C. 术后 36 小时内
 - D. 术后 48 小时内
4. 低钾血症病人最早的临床表现是
 - A. 骨骼肌软弱无力
 - B. 恶心、呕吐
 - C. 心率增快
 - D. 反常性酸性尿
5. 男性,34 岁,外伤致出血性休克病人,补液过程中,护士测得其血压 90/58mmHg,中心静脉压为 4cmH₂O,应给予
 - A. 加速补液
 - B. 减慢输液
 - C. 使用扩血管药物
 - D. 使用强心药



6. 肠外营养最常见的严重并发症是
A. 空气栓塞
B. 高渗性非酮性昏迷
C. 导管性脓毒症
D. 气胸
7. 女性, 45 岁。在腰麻下进行阑尾切除术, 术后 4 小时出现烦躁不安, 测血压、脉搏、呼吸均正常。查体: 下腹部膨隆, 叩诊浊音。首先考虑
A. 肠梗阻
B. 急性胃扩张
C. 腹腔内出血
D. 尿潴留
8. 男性, 40 岁, 因甲状腺功能亢进内科治疗效果不佳, 拟行甲状腺大部切除术。术后第 1 天, 病人烦躁不安, 呕吐, 大汗, $T39.1^{\circ}\text{C}$, $P125$ 次/分, 该病人可能出现的并发症是
A. 甲状腺功能低下
B. 甲状腺危象
C. 心功能不全
D. 伤口感染
9. 男性, 50 岁, 因腹股沟疝行疝修补术。以下说法正确的是
A. 术后第 1 天采取半坐位
B. 术后第 2 天可下地活动
C. 生命体征平稳即可坐起
D. 术后平卧位、腘窝垫枕
10. 高位小肠梗阻容易引起的全身病理生理改变是
A. 感染
B. 肠腔膨胀
C. 水和电解质失衡
D. 中毒
11. 女性, 25 岁, 因急性阑尾炎行阑尾切除术, 护士鼓励其早期下床活动, 主要目的是预防
A. 粘连性肠梗阻
B. 切口感染
C. 肠痿
D. 腹腔脓肿
12. 直肠癌简便而有效的检查方法是
A. 内镜检查
B. 钡剂灌肠
C. 直肠指检
D. MRI 检查
13. 病人, 女性, 55 岁。行胆总管切开取石, T 管引流术。术后出现胆总管远端阻塞时, T 管引流可观察到
A. 胆汁稀薄
B. 胆汁浑浊
C. 胆汁引流量多
D. 胆汁引流量少
14. 对急性胰腺炎的诊断有重要意义的血清学检查指标是
A. 淀粉酶
B. 电解质
C. C 反应蛋白
D. 转氨酶

- 浙 13195# 外科护理学(专)试题 第 3 页(共 5 页)



26. 男性, 70 岁, 因前列腺增生造成排尿困难、尿潴留, 10 小时未排尿。目前正确的护理措施是
 - A. 让病人坐起排尿
 - B. 让病人听流水声
 - C. 用温水冲洗会阴部
 - D. 行导尿术
27. 男性, 65 岁, 膀胱全切直肠代膀胱术后出现高氯性酸中毒, 其主要原因是
 - A. 5%葡萄糖补充过多
 - B. 肠道粘膜重吸收尿液中电解质
 - C. 禁食
 - D. 生理盐水补充过多
28. 高位截瘫病人长期留置尿管的护理措施正确的是
 - A. 每日用生理盐水擦拭尿道口
 - B. 每 4 周更换导尿管 1 次
 - C. 鼓励病人多饮水
 - D. 每周进行膀胱冲洗 1 次
29. 决定骨折愈合快慢最重要的局部因素是
 - A. 感染
 - B. 软组织损伤
 - C. 骨折部位的血液供应
 - D. 软组织嵌入
30. 颈椎病中可导致病人四肢乏力、行走困难的类型为
 - A. 神经根型
 - B. 脊髓型
 - C. 椎动脉型
 - D. 交感型

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 20 空，每空 1 分，共 20 分。

31. 手术病人出现深静脉血栓的原因包括_____、_____、血液高凝状态三大因素。
32. 细胞内液的主要阳离子是_____，细胞外液的主要阳离子是_____。
33. 中国新九分法中，成人双手面积占人体总面积_____%，双前臂面积占人体总面积_____%。
34. 腹外疝的发病原因有_____和_____两大因素。
35. 腹膜刺激征是急性腹膜炎的主要标志，表现为压痛、_____和_____。
36. 门静脉高压分流术后 48 小时内，病人取_____或低坡卧位，术后一般需要卧床的时间为_____。
37. 临床常见的脑疝有_____和_____。
38. 造成肋骨骨折的常见原因除病理因素外，还有_____和_____。
39. 正常成人潮气量约_____ml/kg；生理死腔在潮气量中所占比例小于_____%。
40. 石膏固定病人需密切观察其肢体远端的_____和_____，警惕缺血性肌痉挛的 5 “P” 征。



三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

- 41. 全身麻醉
- 42. 早期胃癌
- 43. Reynold's 五联症
- 44. 张力性气胸
- 45. 关节脱位

四、简答题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

- 46. 简述休克病人血管活性药物应用的护理措施。
- 47. 简述胃十二指肠溃疡急性穿孔非手术治疗要点。
- 48. 简述体外冲击波碎石（ESWL）治疗的护理要点。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

- 49. 女性，55 岁，洗澡时发现右乳房肿物而就诊。检查右乳较对侧高，外上象限皮肤稍凹陷，局部可扪及一直径约 2.5cm 肿物，质硬，边界不清。右腋下可扪及多个直径 0.5cm~1cm 的淋巴结。诊断为乳腺癌。入院后行右乳癌改良根治术。病人术后因右乳丧失伤心哭泣。

请回答：（1）病人右乳局部皮肤凹陷的原因是什么？

（2）目前病人主要的护理诊断/问题是什么？

（3）简述病人患侧上肢功能锻炼方法。

- 50. 男性，65 岁，无明显诱因突然出现脐周阵发性绞痛，并伴有恶心、呕吐，呕吐物为食物，自行服用药物效果不佳，且腹痛程度逐渐加重，呕吐剧烈、频繁，遂来急诊就诊。既往曾因“胃溃疡穿孔”行手术治疗。查体：体温 39℃，脉搏 102 次/分，呼吸 20 次/分，血压 120/80mmHg。腹式呼吸减弱，全腹压痛、反跳痛。血常规示白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，N% 为 80%。腹部立卧位 X 线平片可见肠腔扩张、多个气液平面。初步诊断为肠梗阻，决定收入院保守治疗。病人因疼痛剧烈，情绪较差，担心治疗效果。

请回答：（1）该病人目前的护理诊断/问题有哪些？

（2）该病人目前的护理措施是什么？

