

2025 年 10 月高等教育自学考试
妇产科护理学(本)试题
课程代码:13199

- 1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
- 2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

- 1. 关于葡萄胎患者随访指导,下列描述正确的是
 - A. 注意有无阴道异常出血
 - B. 定期测定血雌二醇
 - C. 定期测定血孕酮
 - D. 尽快备孕
- 2. 正常产褥期子宫恢复至未孕状态所需的时间一般为
 - A. 3 周
 - B. 4 周
 - C. 5 周
 - D. 6 周
- 3. 非特异性外阴炎患者可用的坐浴液是
 - A. 3%乳酸液
 - B. 1:5000 高锰酸钾液
 - C. 5%醋酸液
 - D. 2%碳酸氢钠液
- 4. 在婚前咨询中,通常给出不能结婚建议的情况是
 - A. 男女一方患严重的多基因遗传病
 - B. 男女一方患可以矫正的生殖器畸形
 - C. 男女一方患严重的常染色体显性遗传病
 - D. 直系血亲和三代以内旁系血亲
- 5. 关于子宫颈癌的病理特点,下列描述正确的是
 - A. 内生型最常见
 - B. 外生型又称菜花型
 - C. 溃疡型又称浸润型
 - D. 低级别鳞状上皮内病变具癌变潜能



17. 某女, 诊断为“子宫脱垂”, 当其仰卧用力向下屏气时, 宫颈外口达处女膜缘, 在阴道口可见到宫颈, 其子宫脱垂程度为
- A. I 度轻型 B. I 度重型 C. II 度轻型 D. II 度重型
18. 下列关于会阴部手术患者术后体位的描述, 错误的是
- A. 处女膜闭锁患者应采取半坐卧位
- B. 外阴癌根治术患者应采取仰卧位, 屈膝外展
- C. 阴道前后壁修补术患者应采取左侧卧位
- D. 盆底修补术后的患者应以仰卧位为宜
19. 妇科宫腔镜检查的时间一般应在
- A. 月经期 B. 月经干净后 1 周内
- C. 排卵期 D. 月经来潮前 1 周左右
20. 某女, 剖宫产术后 8 天, 阴道排出一膜样组织, 伴阴道大量流血, 诊断为晚期产后出血。对该患者的护理措施, 正确的是
- A. 需立即行清宫术 B. 遵医嘱使用宫缩剂及抗生素
- C. 保持外阴清洁, 每日冲洗 1 次 D. 禁止性生活至产后 4 周
21. 胎膜早破的主要原因是
- A. 生殖道感染 B. 孕妇营养因素
- C. 胎膜受力不均 D. 宫颈内口松弛
22. 下列胎位异常中, 最常见的是
- A. 肩先露 B. 臀先露 C. 头先露异常 D. 复合先露
23. 早期流产最常见的原因是
- A. 子宫畸形 B. 母儿血型不合
- C. 胎盘梗死 D. 染色体异常
24. 某女, 32 岁, 葡萄胎清宫术后 4 个月出现咳嗽咳血, 应首先考虑患者出现了
- A. 肺转移 B. 脑转移 C. 骨转移 D. 肝转移
25. 某女, 37 岁, 孕 34 周。因“头晕、头痛”就诊。查体: 血压 160/115mmHg, 水肿(++)。实验室检查尿蛋白定量 5g/24h。该患者当前首选的解痉药物是
- A. 安定 B. 阿托品 C. 硫酸镁 D. 冬眠合剂



非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、简答题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分。

26. 简述先兆子宫破裂的临床表现。
27. 简述激素避孕的非避孕益处。
28. 简述预防盆腔炎性疾病后遗症的注意事项。
29. 简述妊娠期应遵循的用药原则。
30. 简述子宫肌瘤合并妊娠患者的护理措施。

三、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

31. 某女,38 岁。因“绒毛膜癌Ⅲ期”入院准备化疗,拟采用的化疗方案是 5-氟尿嘧啶 $28\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ + 放线菌素 D $6\mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 静脉滴注,连用 8 日为一个疗程。
根据以上资料,请回答:
(1) 为该类患者准确计算药物剂量的方法。
(2) 该类患者静脉给药时的护理措施。
32. 某女,26 岁。以“宫内孕 34 周,孕 1 产 0;妊娠合并心脏病”收入院。既往月经规律,未行规律产检。患者自述近日活动后有心悸、气短等症状,休息时无明显不适。检查:体温 36.8°C ,脉搏 115 次/分,呼吸 26 次/分,血压 121/76mmHg,心尖区可闻及舒张期杂音。产科检查:宫高 28cm,腹围 88cm,胎心 145 次/分,无宫缩。
根据以上资料,请回答:
(1) 该类患者早期心力衰竭的临床表现。
(2) 该类患者出现急性心力衰竭时的紧急处理。

